

表 2. テトロドトキシン以外の毒成分を主成分として保有するフグ

生息地	産地	種	主要な毒成分
海水	日本近海	ホシフグ <i>Arothron firmamentum</i>	PSP (STX, dcSTX)
汽水	フロリダ	<i>Sphoeroides nephelus</i> <i>Sphoeroides testudineus</i> <i>Sphoeroides spengleri</i>	PSP (STX, dcSTX, GTX5)
淡水	タイ	<i>Tetraodon leiurus</i> <i>Tetraodon suvatii</i>	PSP (STX, dcSTX, neoSTX)
		<i>Tetraodon fangi</i>	PSP (STX)
	バングラデシュ	<i>Tetraodon cutcutia</i> オキナワフグ <i>Chelonodon patoca</i>	PSP (STX, dcSTX, meSTX, GTX2, dcGTX2, meGTX2, GTX3, dcGTX3, meGTX3)
		<i>Tetraodon</i> sp.	パリトキシン様毒
	カンボジア	<i>Tetraodon turgidus</i>	PSP (STX, dcSTX)
	ブラジル	<i>Colomesus asellus</i>	PSP (STX, GTX2, GTX3)

略号: PSP, まひ性貝毒; STX, サキシトキシン; GTX, ゴニオトキシン; dc, デカルバモイル;
neo, ネオ; me, メチルカルバモイル